



採血のみで簡単に検査できます

NEW
オプション
検査


脳梗塞 心筋梗塞は ある日突然発症します



脳血管疾患・心疾患の年間死亡者数はがんと同水準。
「4人に1人」が動脈硬化を一因とする疾患で亡くなっています。
LOX-index[®]は動脈硬化の進行から将来の脳梗塞・心筋梗塞の
発症までを予測できる新しい血液検査です。

本当は怖い動脈硬化

動脈硬化は自覚症状がないまま進行し、ある日突然脳梗塞や心筋梗塞を発症します。




脳梗塞

寝たきりの原因にもなる疾患
「3人に1人」が死亡か後遺症に



心筋梗塞

突然死の危険のある疾患
年間「約15万人」が発症



生活習慣を改善し、
早期に予防することが大切！

LOX-index[®] [ロックスインデックス] どうして将来リスクが分かるの？

採血のみの
簡単検査！



検査では血液中の酸化した超悪玉コレステロール [酸化変性LDL] と、それを血管の壁に取り込んで動脈硬化を進ませる [LOX-1] というタンパク質を測定します。動脈硬化の進行から将来の脳梗塞や心筋梗塞の発症危険度 (リスク) を評価します。

LOX-1
超悪玉
コレステロール



[血管]

↑検査内容を動画でチェック

検査費用： **13,200**円 (税込)

このような方におすすめします

- 肥満気味である
- 高血圧、脂質異常症、糖尿病などの持病がある
- 脂っこい食事や塩辛い食べ物をよく食べる
- たばこを吸っている、もしくは吸っていた
- 定期的な運動をしていない



Q&A

よくあるご質問

Q. 検査に食事制限などはありますか？

制限はありません。
食前や食後に影響なく受診頂けます。

Q. 実際に脳梗塞になっているか分かりますか？

いいえ。実際に脳梗塞になっているかどうかを見ているのではなく、将来的に脳梗塞や心筋梗塞になりやすい状態にあるかどうかを調べるための検査です。

Q. 検査は一度だけ受ければよいの？

採血した時点の体質を見るものとなりますので、年に一度程度、健診や人間ドックに併せてのご受診をお勧めします。

Q. 検査結果が悪かった場合は？

検査レポートのアドバイスに従って生活習慣などの見直しを行うことをお勧め致します。必要に応じて血管の硬さやつまり具合を調べる検査の受診もお勧め致します。

◆検査結果サンプル（解説資料付き）

発症リスクのレベルを
分かりやすくグラフで記載。

過去の検査結果からの
推移も一覧できる解説付き。

生活習慣改善のための
アドバイス冊子つき

検査結果
LOX-Index® 今回の測定結果 **736**

あなたの発症リスクのレベルは **低リスク群** に分類されます。

検査結果は、特に注目して見て頂くべき項目は、**低リスク** であり、発症リスクが低いと判断されます。

sLOX-1 今回の検査結果 **320** μg/ml
sLOX-1 は前回と比べて減少しております。

LAB 今回の検査結果 **2.3** μg/ml
LAB の値が前回と比べて減少しております。

sLOX-1/sLAB 今回の検査結果 **142** (倍)
sLOX-1/sLAB の値が前回と比べて減少しております。

報告書の見方

検査結果は、特に注目して見て頂くべき項目は、**高リスク** であり、発症リスクが高いと判断されます。

報告書の読み方

LAB値が高い方は、体内の酸化ストレスが高い傾向があります。

酸化ストレスを引き起こす生活習慣について

酸化ストレスは、体内の酸化ストレスを高める要因です。酸化ストレスが高くなると、血管の硬さやつまりが増え、発症リスクが高くなります。

酸化ストレスを減らすためには、生活習慣の改善が必要です。

生活習慣改善のためのアドバイス冊子つき

酸化ストレスを減らすためには、生活習慣の改善が必要です。

酸化ストレスを減らすためには、生活習慣の改善が必要です。

◆予約に関するお問い合わせ

公益社団法人 東松山医師会
東松山医師会病院健診センター
Higashimatsuyama Medical Association Hospital Medical Center

TEL **0493-25-0232**

8:30-17:00 日曜・祝祭日除く

◆検査に関するお問い合わせ

PreMedica 株式会社プリメディカ

フリーダイヤル **0120-39-5119**

受付時間：平日10:00-18:00 土日祝除く

<検査に関する注意点>

- ※ 妊娠中は受診を控えてください。（妊娠中、出産後3ヶ月以内の方は検査数値が高く出る傾向があります。）
- ※ リウマチ、熱がある場合は、検査数値が高く出る可能性がございます。
- ※ 脂質異常症治療薬、抗血小板薬、降圧薬を服用されている方は、検査数値が低く出る可能性がございます。